

## 殺虫剤

# コテツ<sup>®</sup>フロアブル

殺虫剤分類 13

有効成分

クロルフェナピル ..... 10.0%

登録番号：第19184号

性 状：類白色水和性  
粘稠懸濁液体

毒 性：医薬用外劇物

有効年限：5年

包 装：(250ml×20本)×2箱  
500ml×20本



## ■適用害虫と使用方法

(2021年12月22日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数									
りんご	キンモンホソガ ナミハダニ ハマキムシ類 ミノガ類	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内									
	ヨモギエダシャク リンゴサビダニ	2000～ 4000倍														
もも	ミカンキイロアザミウマ	2000倍		200～ 700ℓ /10a				収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内					
	モモハモグリガ カンザワハダニ															
ネクタリン	ナミハダニ モモサビダニ ウメシロカイガラムシ	2000倍										200～ 700ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内
	ミカンキイロアザミウマ	2000～ 4000倍														
おうとう	ナミハダニ カンザワハダニ	2000倍	200～ 700ℓ /10a		収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内								
	チャノキイロアザミウマ オウトウショウジョウバエ ウメシロカイガラムシ															

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数		
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ ミカンキイロアザミウマ ブドウサビダニ ハマキムシ類	2000～ 4000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫60日 前まで	2回以内	散布	2回以内		
	ナミハダニ カンザワハダニ ハスモンヨトウ トビイロトラガ モンキクロノメイガ コガネムシ類 ミノガ類 ブドウハモグリダニ	2000倍							
かき	ナミハダニ カンザワハダニ	2000～ 4000倍		収穫14日 前まで	3回以内			3回以内	
	カキノヘタムシガ イラガ類 アザミウマ類 カキサビダニ								
なし	ナミハダニ カンザワハダニ ニセナシサビダニ	2000～ 3000倍		収穫前日 まで	2回以内			2回以内	
	ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ	2000倍							
かんきつ	ヨモギエダシャク ハスモンヨトウ リュウキュウミカンサビダニ カネタタキ スグリゾウムシ	2000～ 4000倍		収穫前日 まで	3回以内			3回以内	
	アザミウマ類 (ネギアザミウマを除く) チャノホコリダニ ミカンサビダニ	2000～ 6000倍							
いちじく	ヒラズハナアザミウマ カンザワハダニ ショウジョウバエ類	2000倍		100～ 300ℓ /10a	収穫3日 前まで			2回以内	2回以内
小粒核果類	オウトウハダニ ウメシロカイガラムシ イラガ類								
キウイフルーツ	キウイヒメヨコバイ コガネムシ類								
マンゴー	チャノキイロアザミウマ								
ゴレンシ	カンザワハダニ								
ブルーベリー	イラガ類 オウトウショウジョウバエ								
あずき	ハダニ類 ノメイガ類								

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
豆類(未成熟、 但し、さやいんげん、 さやえんどう、 実えんどうを除く)	ハダニ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
実えんどう さやえんどう	ハダニ類 ハスモンヨトウ						
さやいんげん	ハダニ類 アズキノメイガ						
きゅうり	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ ハダニ類 ウリノメイガ ウリハムシ	4000倍			3回以内		3回以内
うり類 (漬物用)	ミナミキイロアザミウマ ハダニ類						
すいか	ミナミキイロアザミウマ	4000倍			2回以内		2回以内
	ハダニ類 オオタバコガ ウリノメイガ						
にがうり かぼちゃ (日本かぼちゃ)	ミナミキイロアザミウマ	2000倍			3回以内		3回以内
トマト ミニトマト	オオタバコガ ミカンキイロアザミウマ ナミハダニ トマトサビダニ						
なす	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ チャノホコリダニ ハダニ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ テントウムシダマシ類				4回以内		4回以内
ピーマン とうがらし類 (ししとうを除く)	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ ハダニ類	4000倍	2回以内	2回以内			
ししとう	ヒラズハナアザミウマ						
キャベツ	コナガ アオムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ オオタバコガ ハイマダラノメイガ	2000倍					

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数	
ブロッコリー	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫3日 前まで	2回以内	散布	2回以内	
茎ブロッコリー	アオムシ			収穫前日 まで				
カリフラワー	コナガ			収穫3日 前まで				
メキャベツ 非結球メキャベツ	ハスモンヨトウ			収穫7日 前まで				
なばな類				収穫3日 前まで				
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ カブラハバチ			収穫前日 まで				
非結球 あぶらな科 葉菜類 (こまつな、チンゲン サイ、なばな類、非結 球はくさい、非結球 メキャベツを除く)	コナガ			収穫14日 前まで	1回			1回
チンゲンサイ				収穫7日 前まで				
こまつな	アオムシ コナガ ハクサイダニ			収穫3日 前まで	2回以内			2回以内
非結球はくさい	アオムシ コナガ							
だいこん	アオムシ コナガ ダイコンサルハムシ	収穫14日 前まで						
かぶ	コナガ ナモグリバエ ヨトウムシ		2回以内	2回以内				
みょうが (花穂)	ハダニ類	収穫前日 まで			散布、 但し花穂 の発生期 にはマル チフィル ム被覆に より散布 液が直接 花穂に飛 散しない 状態で使 用する			

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
みょうが (茎葉)	ハダニ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	みょうが (花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで	2回以内	散布	2回以内
いちご	ハダニ類 ハスモンヨトウ シクラメンホコリダニ ミカンキイロアザミウマ			収穫前日 まで			
ねぎ	シロイチモジヨトウ ヒョウタンゾウムシ類 ネギハモグリバエ ネギコガ			収穫7日 前まで			
オクラ	ハスモンヨトウ オオタバコガ			収穫前日 まで			
レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ ヨトウムシ						
モロヘイヤ	アザミウマ類			2000～ 4000倍			
あしたば	ウドノメイガ	収穫前日 まで					
やまのいも	カンザワハダニ ナガイモコガ	2000～ 4000倍	100～ 500ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	2回以内	
やまのいも (むかご)				収穫3日 前まで			
かんしょ	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000～ 4000倍	100～ 500ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	2回以内	
	ヨツモンカメノコハムシ シロイチモジヨトウ						
はずいも (葉柄)	カンザワハダニ ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 500ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	2回以内	
さといも				収穫3日 前まで			
さといも (葉柄)				収穫前日 まで			
アスパラガス	ハダニ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ジュウシホシクビナガハムシ ヨトウムシ	2000倍	100～ 500ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	2回以内	
ふき	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	2回以内	

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数				
ふき (ふきのとう)	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫90日 前まで	2回以内	散布	2回以内				
てんさい	ヨトウムシ ハダニ類 カメノコハムシ			収穫7日 前まで							
セルリー	ヨトウムシ			収穫14日 前まで							
にんじん	ヨトウムシ キアゲハ ヒョウタンゾウムシ類			収穫前日 まで							
みつば	ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫14日 前まで 但し、伏せ 込み栽培は 伏せ込み前 まで	1回	散布	1回				
みしまさいこ				収穫21日 前まで	2回以内		2回以内				
エンサイ				収穫3日 前まで							
コリアンダー (葉) やなぎたで				収穫7日 前まで							
つるむらさき					1回		1回				
しゅんぎく				収穫14日 前まで	2回以内		2回以内				
しょうが				収穫前日 まで							
葉ごぼう					32倍		3.2ℓ /10a	無人航空機 による散布			
すいぜんじな				ハダニ類 ヨトウムシ	2000倍		100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで	3回以内	散布	3回以内
よもぎ				ミナミキイロアザミウマ				収穫前日 まで	2回以内		2回以内
葉にんにく	ハダニ類	収穫3日 前まで	1回	1回							
つわぶき とうき		収穫14日 前まで	2回以内	2回以内							
せんきゅう		収穫前日 まで									
たらのき		収穫90日 前まで									

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルフェニ ルを含む農薬の 総使用回数
はまぼうふう (葉)	ハダニ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	親株養成期 但し、 収穫90日 前まで	3回以内	散布	3回以内
うど	シクラメンホコリダニ			根株養成期 但し、 収穫75日 前まで			
ほうれんそう	ハウレンソウケナガコナダニ	4000～ 6000倍		2葉期まで 但し、 収穫14日 前まで	1回		1回
さんしょう (果実)	チャノキイロアザミウマ	4000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内		2回以内
とうもろこし ヤングコーン	ハダニ類 オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで			
食用プリムラ	ハスモンヨトウ ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ			収穫14日 前まで			
食用金魚草 食用なでしこ 食用エキザカム 食用せんいちこう 食用トレニア 食用パンジー	ミカンキイロアザミウマ ヨトウムシ類 ハダニ類			収穫3日 前まで			
食用ミニバラ							
茶	チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ チャノナガサビダニ チャノホコリダニ シャクトリムシ類 チャノコカクモンハマキ マダラカサハラハムシ チャトゲコナジラミ			200～ 400ℓ /10a	摘採7日 前まで		
食用ぎく	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ ヨトウムシ類	100～ 300ℓ /10a	収穫3日 前まで	2回以内	2回以内		
きく(葉)	ハダニ類 オオタバコガ		収穫7日 前まで				
きく	アワダチソウグンバイ						
ストック	コナガ アオムシ ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ		150～ 300ℓ /10a	発生初期			

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルフェナピ ルを含む農薬の 総使用回数
花き類・ 観葉植物 (きく、ストッ クを除く)	ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ	2000倍	150～ 300ℓ /10a	発生初期	2回以内	散布	2回以内
しきみ	クスアナアキゾウムシ		200～ 700ℓ /10a				
アザレア	チャノホコリダニ		100～ 300ℓ /10a	収穫14日 前まで			
なんてん(葉)	アザミウマ類						

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルフェナピ ルを含む農薬の 総使用回数
みかん	温室、ガラ ス室等密閉 できる場所	ミカンキイロアザミウマ	300mℓ /10a	10ℓ/ 10a	収穫前日 まで	2回以内	常温煙霧	2回以内
ぶどう		チャノキイロアザミウマ	150mℓ /10a	6ℓ/ 10a	収穫14日 前まで			