

1 | 基本的な施用方法

	希釈倍率	施用方法	散布回数(目安)
定植前(育苗期)	1000倍	葉面散布/灌注	2回
定植後(本圃)	1000~2000倍	葉面散布	1回

散布水量に関しては、各生育ステージでの基本的な散布水量に合わせて下さい。

※「石灰硫黄合剤」と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあります。危険ですから混用は避けて下さい。 ※高アルカリ性資材との混用は避けて下さい。

2 | カネカペプチド®の効果と施用時期

カネカペプチド®は酸化型グルタチオン(GSSG)を含む肥料です。

効果

- ・生育時におけるストレスを低減することで、植物の本来持つ力を引き出します。
- ・光合成能を安定化させます。

施用時期

- ・施用タイミングにより効果が異なります。下記生育ステージでの散布をお薦めします。

□定植前の施用：**活着促進による初期生育の向上**

□定植後の施用：**花蕾の肥大安定化**


3 | 推奨例

施用時期	希釈倍率	効果
定植1週間前 葉面散布/灌注	1,000倍	活着・初期生育促進
定植時 葉面散布/灌注		
定植後10日程度 (外葉展開期) 葉面散布	1,000~2,000倍	光合成能の安定化 花蕾の肥大安定化

※全作型にてお使いいただけます。 ※育苗期はドブ漬け(1000倍)でもご使用になれます。

圃場栽培試験結果(2020年 千葉県柏市、8月7日播種、9月3日定植、11月18日収穫)


定植4週間後の様子(2020年 10月1日撮影)



収穫の様子(2020年 11月18日撮影)



花蕾の肥大性がUP!!



※作物への効果を保証するものではありません。

カガクで
ネガイを
カナエル会社
kaneka

製造元

株式会社 カネカ
R&B本部 新規事業開発部 GSSGチーム
TEL.06-6226-5109 FAX.06-6226-4719
E-Mail: food_production_support@kaneka.co.jp
URL: https://www.kaneka-gssg.com/

販売元

北海道の方はこちらへ **株式会社 カネカ北海道** <https://kaneka-hokkaido.co.jp/>

「カネカペプチド」は株式会社カネカの登録商標です

2021.03