

1 | 基本的な施用方法

	希釈倍率	施用方法	散布回数(目安)
定植前(育苗期)	1,000倍	葉面散布/灌注/ドブ漬け	2回
定植後(本圃)	1,000~2,000倍	葉面散布	1回

散布水量に関しては、各生育ステージでの基本的な散布水量に合わせて下さい。

※「石灰硫黄合剤」と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあります。危険ですから混用は避けて下さい。 ※高アルカリ性資材との混用は避けて下さい。

2 | カネカ ペプチド[®]の効果と施用時期

カネカ ペプチド[®]は酸化型グルタチオン(GSSG)を含む肥料です。

効果

- ・生育時におけるストレスを低減することで、植物の本来持つ力を引き出します。
- ・光合成能を安定化させます。

施用時期

- ・施用タイミングにより効果が異なります。下記生育ステージでの散布(計3回)をお勧めします。

定植前の施用：

活着促進による初期生育の向上

定植後の施用：

肥大の安定化


3 | 推奨例

	施用時期	希釈倍率	効果
定植1週間前 葉面散布/灌注		1,000倍	活着・初期生育促進
定植時 葉面散布/灌注/ドブ漬け			
定植後10日程度 (外葉展開期) 葉面散布		1,000~2,000倍	光合成能の安定化 肥大性向上

※全作型にてお使いいただけます。

生産者様 圃場栽培試験結果(2018-2019)


2018年 8月28日播種、11月9日収穫(熊本県、各処理30株での規格比較)



収穫物の様子(熊本県)



2019年 6月19日播種、8月22日収穫(長野県、各処理30株での規格比較)



重量(g)					
800~900	700~800	600~700	500~600	400~500	300~400

※作物への効果を保証するものではありません。

カガクで
ネガイを
カナエル会社
kaneka

製造元

株式会社 カネカ
R&B本部 新規事業開発部 GSSGチーム
TEL.06-6226-5109 FAX.06-6226-4719
E-Mail : food_production_support@kaneka.co.jp
URL : http://www.kaneka-gssg.com/

販売元